

四庫全書

子部

欽定四庫全書

普濟方卷三百四十五 明 周王朱櫛 撰

產後諸疾門

產後諸疾 附論

凡婦人非止臨產須憂至於產後大須將慎危篤之至
其在於斯勿以產時無他乃縱心恣意無所不犯犯時
微若秋毫感病廣於萬倍何則產後之病難治於餘病
也婦人產訖五臟虛羸惟得將補不可轉瀉若其有病

不須駛藥若行駛藥轉加增虛就中更虛向生路遠所以婦人產後百日以來極須慤懃憂畏勿縱心犯觸及即便行房若有所犯必身反強直猶如角弓反張名曰蓐風則是其犯候也若似角弓命同轉燭凡婦人皆患風氣臍下虛冷莫不由此早行房故也 凡婦人坐產畢且飲冷童子小便一盞不得便卧且宜閉目而坐須臾方可扶上仰卧不得側卧宜屈膝未可伸足高倚床頭厚鋪茵蓐遮圍四壁使無孔隙免被賊風兼時時令

人以物從心擗至臍下使惡露不滯如此三日可止仍不可令多卧如多卧看承之人宜頻喚醒舊說產婦分娩了三日方可上床若三日上床則必就地睡卧又豈可令產婦近地氣乎纔生產畢且先研醋墨三分服之一法云不可服醋墨有傷肺經成咳嗽之戒誠過慮也然醋墨本破凝結之血然不可用大釀之醋仍不可太多即不至傷肺然所在皆同亦有不吃者更產後三日內令產婦嘗聞醋炭氣或燒乾漆烟若無乾漆以破舊

漆器燒之以防血迷血逆血暈不省之弊夏月宜於房
外燒磚以醋沃置於房中夏月房中不須着火及煮粥
煎藥之類分娩之後須臾且食白粥一味不可令大飽
頻少與之為妙遂日漸增之煮粥時須是煮得如法不
用經宿者又不可令溫冷不調恐留滯成疾仍時與童
子小便一盞飲之亦須預脩小便若遇夏月以薄荷養
之新產後不問腹痛有病無病以童子小便以酒和半
盞溫服五七服妙一臈也七日之後方可少進醇酒并此

小鹽味 一法纔產不得與酒緣酒引血逆入四肢兼產母臟腑方虛不禁酒力熱酒入腹必至昏悶七日之後小進此酒不可多飲如未出月間欲酒吃或服藥者可用淨黑豆一升炒至無烟以無灰酒五升燒淋仍加好羌活一兩洗淨拍破同浸尤妙當用此酒下藥或時時飲少許可以避風邪養氣血下惡露行乳脉也如產婦素不善飲酒或夏月之間亦不許強飲一臈之後恐吃物無味可爛煮羊肉或雌雞汁畧用滋味作粥飲之

或吃爛粥猪蹄肉忌母及白蹄猪肉不可過今江浙間
產婦多吃熟雞子云補益亦風俗也三月之後方可少
食溫麥麵成腫疾因食麵早也凡吃物過多恐成積滯
若未滿月不宜多語喜笑驚恐憂懼哭戚思慮恚怒強
起離床行動久坐或作針線用力工巧恣食生冷粘粳
果菜肥膩魚腥之物及不避風寒脫衣洗浴或冷水洗
濯當時未覺大損滿月凡言滿月者謂滿三月非三十
日也之後即成蓐勞手脚及腰腿痠重冷痛骨髓間颼

颼如冷風吹雖有名醫亦不療又不得夜間獨處緣去
血心虛恐有驚悸切宜謹之所有血衣洗濯不得日中
曝曝免致邪祟侵傷又不得濯足恐血氣攻下又不得
刮舌傷心刷牙齒及就下低頭皆成血逆血暈此產家謹
護之常法也滿月之後尤忌任意飲食觸冒風寒恣意
喜怒梳頭用力高聲作勞工巧房慾及上高廁便溺之
類如此節養攝至百晬始得血氣調和臟腑平復自然
安帖設不依此即至產後餘疾矣產婦心下堅大如旋

盤乃飲水所作名曰氣分 婦人童幼至天癸未行之
間皆屬少陰天癸既行皆從厥陰論之天癸已絕乃屬
太陰經也治胎產之病從厥陰經無犯胃氣及上三焦
為之三禁不可汗不可下不可利小便發汗者同傷寒
下早之證利大便則脉數而已動於脾利小便則內亡
津溢胃中枯燥製藥之法能不犯三禁則榮衛自和而
寒熱止矣如發渴而白虎氣弱則黃芪血刺痛而用以
當歸腹中疼而加之芍藥大抵產病天行從增損柴胡

雜證從增損四物宜詳察脉證而用之

方

當歸散

出大全良方

療產後氣血俱虛慎無大補恐增客熱

別致他病常令惡露快利為佳及治腹痛

當歸

芍藥

川芎

黃芩

各一兩

白朮

半兩

右為細末溫童子小便或酒調下二錢如腹不痛者

米飲調之妙

加減四物湯

便產須知

治產後血虛發熱或日間明了暮則

發熱增寒

當歸

川芎

生地黃

山茱萸

右等分每服三錢水一大盞煎至六分去滓服

薤白湯

出千金方

治產後胃中煩熱逆氣

薤白

半夏

甘草

人參

各二兩

石膏

四兩

知母

二兩

括蔞根

三兩

麥門冬

半升

右㕮咀以水一斗三升煮取四升去滓分五服日三

夜二熱甚即加石膏知母各一兩一方無石膏

療如覺煩熱

便產須知

用圓白半夏不拘多少淨洗湯泡七次為末如大豆納鼻中即醒醫學發明云產前寒熱小柴胡湯中去半夏謂之黃龍湯主之

治血氣逆心煩滿

出肘後方

用生竹皮一斤水三升煮取一升半分為再服

皂甲散 治產後魅

川楝皮 皂角樹皮

各一斤

皂角核

各一斤

石蓮

去心

右為粗末煎湯乘熱以物為定熏通手洗於淨房中
就熏洗處鋪薦蓆纔洗了次帛挹乾便吃玉露通真
丸熱酒下二丸便仰睡

芎歸湯

一名立效散
出百一選方

治婦人產後忽兩乳伸長細小如

將腸垂墜直過小肚下痛不可忍危在須臾名曰乳懸
兼治產後惡露不下腹痛或下血太多眩暈不能支吾
妊娠胎動腹痛下血

川芎

當歸

各二
觔

右將芩歸各半舂咀於瓦器內用水濃煎不拘時
候多少溫服餘芩歸各舂半剉作大塊用香爐慢火
逐旋燒烟安在病人面前卓子下要烟氣直上不絕
令病人低頭伏卓子上將口鼻及病乳常吸咽氣直
候用此一料藥盡看病證如何或安或全未安或畧
縮減再用一料如前法煎服及燒烟熏吸必安如此
二料已盡雖兩乳畧縮上而不能復舊者用冷水磨
草麻子一粒於頭頂心上塗片時即去則全安矣此

通真子秘方一方加縮砂腹中刺痛加芍藥口乾煩
渴加烏梅麥門冬發寒加乾薑白芍藥水停心下微
有嘔逆加茯苓生薑虛煩不得眠加人參竹葉大便
閉澀加熟地橘皮杏仁小便不利加車前子腹脇膨
脹加厚樸血崩不止加香附子咳嗽痰多加紫苑牛
夏生薑腰痛脚痛加牛膝心下疼痛加玄胡索惡血
不下腰腹重痛加牡丹皮煎

治婦人臨產服催生藥驚動太早未當離經而用力大

過以致育膜有傷產後水道中垂出肉線一條約三四尺長牽引心腹痛不可忍以手微動之則痛苦欲絕龍興鐵柱觀前有一產婦患此諸醫皆用失笑散雖畧止痛而不能得肉線離脫後有一道人來問證因白諸醫用失笑散儘不瘥但不能絕根乃買老薑三觔淨洗不去皮於石鉢內研爛用清油二觔拌勻入鍋內烱熟以油乾焦為度先用熟絹一段約五尺長摺作結方令穩重婦人輕盛起肉線使之屈曲作一團納於水道中却

用絹袋兜裏油薑稍溫傳在肉線上熏覺姜漸冷又用熨斗火熨熱使之常有薑氣如薑氣已過除去又用心如此熏熨一日一夜其線已縮大半再用前法越兩日其肉線盡入腹中其病全安不復痛矣却服失笑散芳歸湯補理道人云此乃魏夫人秘傳怪病方切不可使肉線斷作兩截一斷則不可醫

當歸散

出大全良方

治產後補虛益血

當歸

羌活

各一兩

延胡索

五錢

右為細末用豬腰子一隻切作片以水一盞入藥末

二錢同煎至七分同腰子喫

蓬莪朮散

出大全良方

治產後血海氣虛腹臍疼痛心胃注

悶每遇經脉行或多或少及有積塊者

莪朮

桃仁

去皮尖炒

大黃

濕紙煨

當歸

炒各一兩

桂心

川芎

木香

牡丹皮

延胡索

炒

赤芍

各五

錢

右為細末溫酒調一錢空心臨卧服

療產後大虛心腹急痛血氣上搶心氣息乏補益方出

全良

方

黃芪

白朮

當歸

甘草

各二兩

生薑

四兩

人參

二兩

右先以白羊肉三觔去膜以水一斗九升煮肉取汁
五升後下諸藥更煎取三觔分溫三服

得勝丸 治婦人產後血氣虛冷腰腹大痛便利膿血

川烏

炮去皮
一兩

五靈脂

二兩

沒藥

錢二

右為細末醋糊為丸如豆大每服二三十九食前酒

下

竹根湯

出千金方治產後虛煩

甘竹根

細切一斗五升

右以水二斗煮取七升去滓用小麥二升大棗二十枚復煮麥熟三四沸內甘草一兩麥門冬一升湯成去滓服五合不瘥更服取瘥短氣亦服之

蘓麻粥

便產須知

治產後鬱多汗汗則大便秘難於用藥唯

此粥最佳此粥不獨產婦可服老人諸虛人風秘皆可服昔有老人年八十四歲風秘臟腑壅血氣聚膈中腹脹惡心不喜食氣上攻頭目頭神昏迷此藥氣血結糞自下諸病悉去

紫蘊子

大麻子

淨洗各半兩

右為細研用水再研濾汁一盞分二服煮粥食

淡竹茹湯

治產後虛煩頭痛短氣欲絕心中悶亂不

解

生淡竹茹

麥門冬 小麥各五升 甘草一兩

生薑

三兩產實
用乾葛

大棗

十四枚產實
用石膏三兩

右咬咀以水一斗煮竹茹小麥取八升去滓乃內諸藥煮取二升去滓分二服羸人分作三服若有人參入一兩若無人參內茯苓一兩半亦佳人參茯苓皆治心煩悶及心虛驚悸安定精神有則為良自無依方一劑不坐更作苦氣逆者加半夏二兩

芍藥梔豉湯

出拔
梓方

治產後虛悶不得眠

芍藥

當歸

梔子

錢各

五

香豉

合半

右如前修產後傷寒便同下後變證

治產後煩渴潮熱

出危氏方

用五苓散枳杷葉去白毛蜜塗炙用麥門冬二十

粒去心煎湯服

方見寒暑濕門中暑類

治產後心悶手脚寒熱氣力欲絕暈連心頭硬及寒熱

不禁用接骨木破如筭子一握以水一升煎取半升分

溫二服或小便數惡血不止服之即瘥此木可煮三次

其力一般此是起死人方

治產後心悶手足煩熱厭厭氣欲絕血暈心頭硬作熱

增寒忍不禁

出肘後方

用續斷皮一握剉以水三升煮取一升分三服服

如人行二三里再服無所忌此藥救產後垂死

治產後心悶手足煩熱氣力欲絕血暈心頭硬及寒熱

不禁

出肘後方

用玄胡索炒搗為末酒服一錢匕亦治穢汚不盡

腹滿

千金三物黃芩湯

治婦人在草蓐自發露得風四肢

苦煩熱頭痛者與小柴胡湯頭不痛但煩者此湯主之

黃芩

兩一

苦參

兩二

乾地黄

兩四

右以水八升煮取二升溫服一升多吐下蟲

腎氣湯

治婦人病飲食如故煩熱不得卧而反倚怠

者何也師曰此名轉胞不得溺也以胞系子戾故致此病但利小便則愈

乾地黄

八兩

薯蕷

四兩

山茱萸

四兩

澤瀉

茯苓

三兩

牡丹皮

三兩

桂枝

附子

炮各一兩

右咬咀以水六升煮取二升去滓分三服日三

人參當歸散

出大方

治產後去血過多血虛則陰虛陰虛

生內熱內熱曰煩其證心胃煩悶吸吸氣短頭痛悶亂骨節疼痛肺時輒甚與大病虛煩相類急宜治之

人參

當歸

乾地黄

桂心

各一兩

白芍

二兩

麥門冬

一兩

右咬咀每服四錢水二盞先將粳米一合淡竹葉十片煎至一盞去米竹葉入藥并棗三枚煎去七分去滓溫服虛甚者用熟地黄食前服一方血熱甚者加生地黃

產後榮血暴竭

便產須知

治婦人血禁失音衝惡用鑰匙以

生薑醋小便煎服弱房人煎湯服亦得

用大劑芩歸湯

方見本門諸疾類

艾煎丸

出衛生家寶方

治婦人產後血海虛弱面無顏色腹痛

身體倦怠

艾葉

去梗一觔

乾薑

半觔

當歸

四兩洗

附子

二個炮去皮尖切

白芍藥

半觔

熟乾地黄

四兩洗

右五味各切細用米醋五升煮乾取出焙乾為末醋糊丸如桐子大每服三五丸酒下不吃米飲食前忌生冷物又方燒荔枝核灰研和服

烏金散

出衛生家寶方

治婦人產十八種疾宜預服不生諸病

沒藥

半兩生

血餘

半兩男子者燒灰

紅花子

一分生

伏龍肝

一分

當歸

半兩

乾栢葉

一分

赤龍鱗

半兩 鯉魚鱗 燒灰存性

香墨

一分 燒紅 米醋淬

凌霄

半兩

右為末每服二錢熱酒下不拘時候酒不宜多

玄胡索散

產經

治產後血氣攻刺疼痛不止及新舊虛實

痛不止

當歸

酒浸

玄胡索

赤芍藥

蒲黃

紙隔炒

乳香

水研

桂

不見火 去皮

沒藥

各五錢

右計七味細末挑三錢酒調空心下

四物湯產經治大產小產對證合服立效

腹中刺痛惡物不下

加當歸芍藥各半錢

口舌乾欲飲水

加括蘆麥門冬去心各一錢

水停心下微吐逆

加木猪苓茯苓防己各半錢

虛寒狀類傷寒

加人參柴胡防己各半錢

發寒熱

加乾薑牡丹芍藥各半錢

燥大渴

加知母石膏各半錢

因熱生風

加川芎柴胡各半錢

虛煩不得眠

加人參竹葉各半錢

大便秘

加大黃半錢炒

頭痛或身熱

加柴胡黃芩各半錢

小便澀

加桃仁去皮
尖炒半錢

腹脹

加厚樸枳實
炮各半錢

滑瀉

加官桂附
子各半錢

嘔

加人參白
朮各半錢

血崩

加地黃蒲
黃各一錢

山蘄散

楊氏家
藏方

治產後諸疾血氣作痛散堅塊逐惡血

當歸

洗微
炒

沒藥

亂髮

用男子髮入
小瓶燒灰

凌霄花

各半
兩

紅花子

伏龍肝

甘柏木

松煙墨

燒各
一分

鯉魚鱗

一兩
燒

右件為細末每服二錢熱酒調服食前

黑神丸

楊氏家藏方

治產後諸疾

巴豆

半兩以水兩碗煮盡去皮心出油

白薑

半兩去皮

肉桂

半兩炮去皮 黑附子

半兩炮去皮尖

右為末麴糊丸如蘿蔔子大每服三丸五丸冷茶下
熱茶投之瀉下三五行了以粥止瀉出惡物百病皆
除一日內忌熱食

保生丸

王氏傳濟方

治產前產後血氣風冷及是婦人所患

一切疾病皆理療神驗

金釵石斛

一分別研

秦朮

官桂

去皮

乾地黃

貝母

防風

糯米

甘草

炮

乾薑

細辛

已上各一分

當歸

蜀椒

去黑子只取皮

大麻仁

大豆卷

黑豆皮是

黃芩

已上各二分

石膏

明淨者

麒麟竭

沒藥

龍腦

各一錢半

右一十九味並須州土新好者大分細搗羅為末煉蜜六兩熟須入水一分同煉令水盡和藥為丸先杵五百下後凡如彈子大勻可成七十二丸用湯使治

產伏如後 產前產後血風頭旋身戰用薄荷酒下
月信不通常歸酒下 赤白帶下溫酒下 婦人臨
產難產胎衣不下子死腹中橫產倒生死絕不語但
看心頭熱氣在取一丸用芳棗湯研灌口中但入喉
立甦神妙 產後惡血不盡臍腹疼痛嘔吐發熱增
寒煩悶月後不調或多或少皮膚腫產血不止虛勞
中風口噤不語半身不遂產前產後赤白痢大便秘
澀渴血暈誑語見鬼頭痛面色痿黃漸成勞瘦飲食

無味已上病狀並用溫酒研下一丸服至五七丸臨產五臟不痛男女易生神驗難述催生當歸酒下

產後中風血暈生地黃同煎十沸研藥一丸灌之立差
禦風但五旦度爛嚼一丸空下熱酒下或浴後嚼一丸溫酒下
小兒天弔驚風薄荷酒下一丸分作三服以衣被蓋但汗出相次揭衣被便當風坐卧立差其婦人身邊一切諸病但以溫酒及當歸薄荷同研一丸立差

阿膠丸 治產前產後神妙方

真阿膠

四片火炙令熱為度

蛇蛻皮

一條燒灰

敗筆

一管用頭連艾燒灰

大麥花

少許炙乾如無此花以麥牙代之為末

右件五味藥一處碾研細以軟糯米飯為丸如鷄頭大如丸時粘手以少許麪為丸如婦人有身十箇月滿足者有諸般疾病用井花水磨下一丸產後有病用通靈散一字醋湯調磨水一丸此藥大安胎臟如築打着及胎死在腹中用醋湯下一丸產噫用千金

散子一字熟水調下一丸產前後被血衝心用黃散
子半錢醋湯調下一丸產後遺瀝不止用燒鹽半錢
無灰酒下一丸難產者三日至五日服此立下用通
靈散子一字醋湯調下一丸如女人產時衣先下兒
未見足踏衣生用通靈散一字調下一丸如兒先下
衣未見須使用醋湯下一丸如前後必用通靈散子
一丸調下一丸如漿破後經三五日不生用黃散子
酒調下一丸產前產後痢醋湯下一丸血氣用艾枝

煎下一丸。鷲粟米炒令黃為末，是千金散。真阿膠炙令黃為末，是黃散。子蛇蛻皮燒灰為末，是通靈散。

常山飲子 治產後血海虛竭發狂悶亂時作

常山

石膏

大黃

甘草

炙

鼈甲

酥炙

柴胡

去苗

右件五味各等分，為末。每服三錢水二盞，煎至一盞，放冷服。兼治室女體熱紅脉不行。

犀角飲子 治產後亡津液虛損時自汗出發熱困倦

唇口乾燥

犀角

白朮

麥門冬

去心各半兩

柴胡

一兩

枳殼

麩炒去瓢

地骨皮

生地黄

甘草

炒

當歸

揀參

茯苓

去皮

黃芩

黃芪

各七錢

右為粗散每服三錢水一盞半浮小麥七十粒生薑三片煎取七分去滓食遠溫服

牡丹皮散

治產後寒熱臍下疼痛煩燥神效

牡丹皮

地骨皮

海桐皮

青皮

陳皮

天台烏藥

沒藥

各二錢半

右件六味羅為細末後入沒藥再研勻重羅過每服抄二錢水一盞煎至七分如寒多熱服熱多寒服一日三服忌生冷硬醋滑物

橘香丸

治產後傷血津液暴竭大便閉澀

橘紅

杏仁

各等分

右為末蜜丸如梧桐子大每服七十丸空心米湯吞下六七日腹滿痛宜麻仁丸又宜食蘓麻粥

葦草汁 治產婦大喜汗出汚衣赤色及膏淋尿血

葦草

不拘多少

右搗取汁二升醋二合和同服飲一杯或濃煮汁飲亦治淋瀝尿血

柑皮湯 治產後發渴經脉過多發渴者亦治

柑子皮

焙乾

右為末白湯調二錢許服其效莫述千金方云產後發渴速覓柑皮

榴附飲 治產後瀉

香附

酸石榴皮

米醋炒
等分

右二味為末每服二錢米飲下

枳朮丸 治產後心腹堅大如盤水飲所作名曰氣分

枳實

一兩半

白朮

三兩

右以咀每服四錢用水一盞半煎七分去滓服

秦朮湯 治偶傷風惡熱渾身疼痛

熟地黄

三分當歸

白芍藥

秦朮

柴胡

甘草

地骨皮

各一分半

右計一兩二錢桃仁五錢水一盞半煎至八分日進三服熱退住服或四物湯蘓木煎

養氣活血丸治產後諸虛不足若傷血氣真元內弱四肢倦乏肌肉消瘦及脾元虛損不入飲食或吐瀉自汗或寒熱往來

大艾葉

炒出取細末五兩

乾薑

炮取細末二兩半

右件用好醋二升半無灰酒二升生薑自然汁一升

將前薑艾末同調勻放器內慢火熬成膏

附子

二兩半

白芍藥

白朮

椒紅

川芎

當歸

紫巴戟

人參

五味子

各二兩

右件藥搗羅為細末入前膏子并炒熟白麴二兩半
同和為劑入杵臼內搗一千下丸如梧桐子大每服
五十丸溫酒米飲食空心下

沒藥散

治產後百疾

沒藥

血竭

各等分

右細末每服二錢用童子小便合酒半盞煎一服溫調下纔產一服上床良久再服其惡血自循下行更不衝上免生百疾

小黑神散 治產後產前皆可服大能治血定痛消逐利積亦治橫逆

香白芷

炮半兩

百草霜

細研二錢半

右二味和勻每服二錢醋湯熱服如橫逆用童子小便好醋各一茶脚百沸湯四五分服一方等分白芷

生用兼治腰脇痛

濟生增損四物湯

治產後陰陽不和乍寒乍熱惡露

停滯亦令寒熱也但看小腹急痛為異

當歸

酒浸

白芍藥

川芎

人參

乾薑

各一兩

甘草

炙半兩

右以咀每服四錢薑三片水煎無時

芍藥湯

出保命集方

治產後諸積不可攻當養去熱其病自

退宜服

芍藥

一觔

黃芩

茯苓

各六兩

右三味為粗末每服半兩水煎日三去滓溫服

治產後坐草多時寒熱所損腹中成塊忽衝心背臍腹

疼嘔逆惡心不思飲食宜服此方須是大腹冷可喫也

出護
命方

當歸

一兩

官桂

桑寄生

各半兩

獨活

豆蔻

川芎

各一兩

細辛

三株

芫花

醋炒土器內黃黑色十銖

右為細末修製芫花研為末每服衆藥末二錢芫花

末半錢共為一服空心土器內煎葱湯調下熱服

治產後頭冷項重頸軟非時聞頭面上肌肉痺大腑虛
冷頗出後又或無糞或時洩瀉兩足沉重少精神行步
無力面色黃瘦或產後未經百日經後通行忽因誤喫
涼藥有此疾候忽自懷孕時間通身寒冷至產後却有
此疾但合硫黃丸與此藥相間服多服硫黃丸不妨也
吃此一方了却修合下面一方喫此兩方各喫一料

出

命方

防風

藁本

澤蘭

獨活

各一兩

五味子

川芎

白芷

當歸

破故紙

炒

白朮

石斛

續斷

各半兩

右為細末煉蜜丸如梧桐子大早晨空心鹽湯下五

十九

治產後亂喫物致傷損血氣身體虛弱飲食減少眼如

貓兒

出護命方

當歸

續斷

官桂

各半兩

芍藥

桔梗

羌活

羌花 醋煮炒
金黃黑

川芎 各一分 牽牛 炒

細辛

各三
株

右為細末每服四錢水一盞二分煎取一盞空心和滓
喫只用土器內煎

治產後肝氣虛弱風邪所中肝氣既虧不能生心心乏
生氣非時驚恐一切產後有虛冷中驚悸之候大腑虛
冷此三方藥不可闕一 出護
命方

當歸

石斛

五味子

川芎

各半
兩

防風

破故紙炒獨活

藁本

白朮

各一分

右為細末煉蜜梧桐子大早晨空心木瓜二片鹽少許同煎湯下五十丸

治產後肝虛中風其狀頭冷痛忽偏痛至晚即痛但頭痛時間頭骨內冷痛大腑不調喫食減少宜服此藥若是發熱頭痛即不可喫此方

出護命方

當歸

防風

桑寄生

甘草

細辛

獨活

川芎

各一分

右為細末每服一錢半水一盞煎取九分間頭冷痛
發作時即空心喫

治產後正氣不足咽喉乾口無津液飲食減少大腑不
調又似虛弱之故不可涼其上隔宜服此生液寄生散

出獲
命方

桑寄生半人參一分甘草炙三沉香一株

右為細末非時口含化嚥津每服一錢八分水一盞
煎至六分時喫亦得

治產後大腑虛冷却因用性淤怒其氣上逆因而血暈其狀頭覺重痛昏昏如醉思睡語聲低小宜喫此方若是大腑熱并血暈時壯熱頭痛不可喫此藥已有上見

藥方

出肘後方

麻黃

去根

延胡索

川芎

防風

各一分

官桂

去皮半兩

右為細末每服一錢半水一盞煎取九分非時去滓喫不要多喫病住即止藥

治產後大腑虛冷因怒後成血暈喫前方藥未效却更

加頭痛壯熱面赤如醉宜喫此方

出護命方

牡丹皮

去心

荊芥穗

羌活

麻黃

去根各

一分

右為細末每服二錢水八分一盞煎一兩沸急瀉出
食後徐徐去滓熱喫病減即住藥

治婦人忽因經候行時忽因產後喫生冷不相當之物
忽產後起早衝風傷損血氣俱病經候過多臨經候行
時氣痛不可勝忍方但婦人血氣痛俱可與此方

出萬金護

命方

當歸

續斷

獨活

艾葉

炙

芍藥

木香

芫花

醋土器內
炒微黃

官桂

各一分

延胡索

川芎

牛膝

各半兩

右細杵羅為末每取二錢半土鉢內煎葱湯調下空
心喫若喫數服未安其人必大腑熱每服添熟牽牛
子半夏末半錢喫

治產後小遺登後早葱亂物早宮臟傷風飲食減少近

十日遠經半月飲引食不進纔喫一口湯水即聞所喫
湯水巡歷方由胃中而下入胃既入胃仍舊不出面色
青黃形體困重宜服此方若得此病須是每日喫得一
兩盞酒方可延得半月未死急宜治之

細辛

官桂

川芎

當歸

各半兩

羌活

藿香

各一分

吳茱萸

三錢

甘草

炙四錢

右為細末每服三錢空心煎防風湯調下喫了渾身
手足暖忽頭痛即連喫一二盞候通身發熱忽行下

惡血物即便安樂也若人得此病須是依得上面題
目方可喫此藥

治產後熱悶氣上衝變為脚氣者何答曰產卧血虛復
因春夏取涼過多地之蒸濕因足履之而為脚氣之狀
熱悶掣癢驚怖心煩嘔吐氣上皆其候也服小續命湯
二三服自愈醫人誤遂以敗血藥攻之則血去而疾盛
增矣

人參

黃芩

桂

去皮

麻黃

去節

防已

川芎

甘草

白芍藥

白朮

各二錢

附子

炮黑一錢

防風

牛一錢

右計一兩一錢半剉末作四服生薑五片水二盞煎一盞溫服評云脚氣故是常病未聞產後能轉為者初不知脚氣得之不覺因他病之後血氣方發產後既虛發則無疑小續命湯知其證加木瓜煎引入經絡治之切忌湯藥淋洗

治產後壯熱頭痛煩赤口乾唇焦多煩渴燥昏悶不爽

松花

川芎

石膏

蒲黃等分

右為末每服二錢水二合紅花一捻同煎七分去滓
粥後溫溫細呷

治產後下白涕不止方

當歸

白芷各一兩

杜仲去皮

萆薢各半兩

兔絲子半兩

牡蠣火煨三分

艾葉炙

龍骨

川芎

各一分

山茱萸兩

牛

右為細末兩三次羅如飛塵空心鹽湯下三錢

濟危上丹 治產後所下過多虛極生風氣無所主唇

青肉冷汗出目瞋神昏命在須臾

乳香

研

五靈脂

糖心香潤水淘出砂

生硫黃

別研

阿膠

炒

玄精石

別研極細四味和瓦器微炒再研

生卷柏

焙

桑寄生

無以續斷代

淨陳皮

各等分

右後四味細末和前藥地黃汁和丸梧子大每服二
十丸空心當歸酒下

紫湯 破血去風除氣防熱產後兩日尤用服之

用烏豆五升選擇令淨清酒一斗半炒豆令烟向
繞投入酒中看酒赤紫色乃去豆量性服可日三
盞如風中口噤即加鷄屎白二升和熬投酒中神
驗

治產後血病

取瘡藥乳及水煮服之

治婦人產後冷血

以櫓炒令黑及熱投酒中漸漸飲之

治產後疾

以麥蕎作羹食之良

治婦人虛羸勞損因產瘦血氣結積腹內冷痛腸鳴下痢腰痛癥瘕崩中大下以淡菜燒食一頓令飽大效又名穀菜常時頻燒食即若不宜人與少米先煮熟後除肉內兩邊鏤及毛了再入蘿蔔或紫蘇或冬瓜皮煮作臠食之

治產後血氣暴虛汗出

用淡竹瀝三合微煖服之須臾再服

治產後惡露不盡怯起衝心腹中攪痛及經絡不通

以細研乳頭香為末方寸匕酒煎蘇方去滓調服

立下惡物差

治產後秘結膨脹不通轉氣急坐卧不安

以大麥蘗末一合和酒服食良久通轉驗

治產後諸血氣

以白馬屎汁溫服之

治婦人產後腸中痒不可忍

以針線袋安所卧褥下勿令知之

治產後破血止血渴

以小白芋煮食之飲其汁良

治婦人產後腹中癢

用箭筈及鐵安所卧席下勿令婦人知

治產後諸疾結痛血上欲死

以倒掛藤煮汁服之

聚珍丸

出朱氏集驗方

治婦人小產後虛羸百節疼痛不進飲

食百藥不效

艾煎丸

卷柏丸

茴香丸

烏雞煎丸

巴戟丸

右五味合作一藥鹽湯溫酒任下兼服沉香荊芥散

張氏方

治幼婦初產傷水多有此證殺人最急

用鰾膠為末酒服滓傳傷處

集驗方

防風

天南星

等分

右為末酒服仍以傅傷處南星為防風所製不能麻

人

海上方 新產使用此方可無破傷風之患

苦薺煎沸湯候通手淋洗 又馬齒莧煎湯熏洗

治產後血痛如刀刺

出大全良方

熟地黄

橘皮

等分

右為末每服一錢粥飲調下尋常痛發可常服

治產婦血滿腹脹痛血渴惡露不盡月閉止好血下惡

血去鬼氣痙痛癥結

出本草

取芒硝燒為末酒下或以酒煮彌久著煙者佳

治產後傷冷腰痛動不得者

用蒴藿葉火燎厚鋪床上起熱即卧於上冷復旦
之冬月取根杵碎炒及熟準前用

產後調補

凡產後七日內惡血未盡不可服湯候臍下塊散乃進

羊肉湯有痛甚切者不在此例後三兩消息可服澤蘭丸此至滿月丸盡為佳不爾虛損不可平復也全極消瘦不可救者服五石澤蘭丸凡在蓐必須服澤蘭丸補之服法必七日外不得早服也 若產後將息如法四

肢安和無諸疾者亦須先服黑神散四服亦畧脩補益丸散之類不可過多又恐因藥致疾不可不戒如四物湯四順理中丸內補當歸丸當歸建中湯或產婦血盛初經生產覺氣悶不安者調七寶散服之若寧貼不須

服若三日後覺壯熱頭痛胃腑氣刺者不可便作傷寒
風治之此是乳脉將行宜服玉露散一二服如無此證
不須服若因床帳大煖或產婦氣盛或素多喜怒覺目
眩暈如在舟中車內精神鬱冒者此是血暈即須服血
暈藥一二服止仍須看承之人照管體問也或覺粥食
不美虛困即服四順理中丸一二服若不如此不須服
若於兩三日間覺腹中時時撮痛者此為兒枕作痛必
須服治兒枕藥二三服若大便秘或小便澀切不可服

通利藥以其無津液故也若通利之藥則滑泄不禁不可治也切須戒之若秘甚必欲通利者方可服和煖湯即通 凡產後宜常進溫粥食勿則熱熱則滯血七日之後方可與酒及些鹽味煮羊肉猪蹄肉及猪肚中物忌母猪及白蹄猪宜烏雞及雞蛋煖血食物不宜過多及生冷肥膩恐成積滯大抵正產止是血臟空虛補其虛生好血化惡血保其臟氣去其風邪耳

方

地黃羊脂煎

出海上方

治婦人產後欲令肥白飲食平調方

見本門產後虛羸類

羊肉湯

出千金方

治產後及傷寒大虛上氣腹痛兼微風

茯苓

黃芪

乾薑

各三兩

甘草

獨活

桂心

人參

各二兩

麥門冬

七合

生地黄

五兩

大棗

十枚

肥羊肉

二觔無羊肉用麋腐代

右咬咀以水二斗煮肉取水一斗內藥煮取三觔半

分四服日三夜一一方無乾薑

產後醋墨

出大全良方

以松煙墨不拘多少用炭火煨通紅以米醋淬之再煨再淬如此七度研令極細用絹羅過纔彥喫醋墨三錢用童子小便調下

四順理中丸

出千金方

治產後氣血俱傷五臟暴虛四肢羸

弱少氣多汗直至百晷每日常服壯氣補虛調養臟氣蠲除餘疾消穀嗜食兼治產後臟虛嘔吐不止瀉

附子

甘草

人參

白朮

乾薑

各一兩

右為細末蜜丸如梧子大每服十丸增至二十九丸溫
米飲湯調下纔產了以童子小便打開點服七日內
三日服 產乳方云此乃大理中丸加甘草兩倍耳
然其功比之四味等物分大故不同蓋取甘味以緩
其中而通行經絡之功最勝者也此產婦月內不可
闕者出月不須服矣古方中有婦人補益之藥大澤
蘭丸小白微丸熟乾黃丸大聖散之類其藥味稍衆

而中下之家村落之地卒何以致且藥肆少有真者
不若以四順理中丸易之較其功此澤蘭丸之類主
治頗多也

產如未出月飲酒或喫藥宜造黑豆酒

用淨黑豆一升炒令甚熟以無灰酒五升淋之仍
入羌活一兩同浸尤妙時時飲之或用此酒下藥
可以辟風邪養血惡露行乳脉

當歸人參散 治產後虛損痿弱難以運動痠痛胃滿

不思飲食

當歸

白朮

黃芩

芍藥

大黃

茯苓

陳皮

各半兩

人參

黃耆

厚樸

薑炙

川芎

官桂

各三錢

甘草

一兩

枳殼

四錢去穢炒

右末每服三錢水一盞半薑三片煎至六分去滓不拘時溫服如大便閉以此散下和中丸

治新產婦

用黑雄鷄一隻理如食法和五味炒熟香即投二

升酒中封口經宿取飲之令大肥白

治新產婦

用黑雌雞和烏油麻二升熬令黃香末入酒酒盡
極效

補中丸 宜常服

川芎 白芍藥 黃耆 當歸 人參

陳皮 各半兩 白朮 地黃 各一兩

右為丸煉蜜如梧子大每服五七十九溫水下

滋血湯 滋養榮血補婦人諸虛治血海久冷

當歸

川芎

芍藥

人參

麥門冬

牡丹皮

阿膠

各三兩

琥珀

三分別研

酸棗仁

炒

粉草

桂心

各一兩

半夏

二兩半

右為粗末每服三錢水一盞薑三片煎七分去滓溫

服一日三服

大保生丸 調和本氣主療諸疾滋補榮衛久服之大

有功益

人參

藁本

白茯苓

當歸

乾地黃

赤石脂

白芷

玄胡索

肉桂

白薇

白芍藥

川芎

白朮

甘草

牡丹皮

沒藥

各半兩

右為細末煉蜜丸如彈子大每服一丸溫酒化下空
心食前服之

滋陰丹駐養血和氣調順榮衛充盛肌膚活血駐顏久
服大補衝任勻順月經神良不可具述

熟地黃 白茯苓 人參各三兩 甘菊花 枸杞子

黃耆 丹參 栢子仁炒 白芍各一兩 生地二兩

右為細末蜜和丸如梧子大每服五十丸至六十丸
米飲空心下日進二三服

八珍湯 和榮調衛理順陰陽滋血氣進美飲食

當歸 川芎 赤芍藥 熟地黃 人參

茯苓 甘草 縮砂仁各等分

右為粗末每服三錢水一大盞入生薑七片棗三枚

去核同煎三五沸去滓放溫空心日三服

人參養血丸

治女人稟受怯弱血氣虛損常服補衝

任調血脉宣壅破積退邪熱除寒痺緩中下堅脹安神
潤顏色通氣悶兼治婦人懷身腹中絞痛口乾不食崩
傷眩暈及產出月羸瘦不復常者

人參

赤芍藥

川芎

菖蒲

各一兩炒
作蒲黃

當歸

二兩

熟地黃

五兩

烏梅肉

三兩

右為末蜜搜杵數千下丸如桐子大每服五十丸至

百丸溫酒米湯任下食前服

拱辰丹 治當壯年而真氣猶怯此乃稟賦素弱非虛衰而然也燂燥之藥尤宜速戒勿謂手足厥逆便云陰多如斯之證治之不惟不能愈疾大病自此生矣滋益之方羣品稍衆藥力細微難見功效但固天元一氣使水升太陰則五臟自和百病自去此方主之

鹿茸

酥炙去毛皮角

山茱萸

新好有肉紅潤者

川當歸

各四兩

麝香

半兩別研

右為末入麝香拌勻酒煮麪糊為丸如梧桐子大
服百粒或五十粒溫酒鹽湯下

暖宮丸

當歸

川芎

禹餘糧

醋拌七次
各一兩

附子

炮去
皮桂心
各三
兩

右為細末酒糊丸如梧桐子大空心酒服三十丸日
進二三服增至五七十丸

治產後更無他狀

肥羊肉脂

當歸_{二兩}

生薑_{六兩}

右切以水一斗_闕

溫分服若覺惡露_{不盡}加桂心_兩_闕

薊_兩覺有氣加細辛二兩覺有加_兩_闕

地黃汁二合_闕

庵劉尚書第五子_闕卿叔謙之內李_闕

母不得而情動於中又_闕勞後四肢困倦躁_闕

減少食則嘔吐弱_闕急情嗜卧醫作傷寒以_闕

又以小柴胡大柴胡之類治之至十餘日之後病

關

生家前藥

關

無效莫非宅證否醫曰此傷六經傳變

至再經得汗則愈異日見爪甲微青黑色足跣至腰如水目上視覩不轉睛咽嗑不利小腹上衝而痛嘔吐不止息氣欲絕以為不救日久命視之具說病證及所服之藥予診其脉沉細而微此中氣不足妄作傷寒治之發表攻裏中氣愈損壞證明矣大夫人泣下避席曰病固危困君盡心救治予笑以辛熱之藥咬咀一兩作一

服合夜藥熱而不能飲續續灌之下一時飲至半夜稍有吟呻之聲體漸溫忽索粥飲至旦食粥兩次又煎服投之至日高衆醫診之曰脉已生證已回矣衆喜而退後三日大夫人曰病人大便不利或曰以脾約丸潤之可也予曰前證用大辛熱之劑陽生陰退而愈以大黃之劑下恐寒不協轉生他證衆以為不然遂以脾約丸二十九之至夜下利而行異日而色漸青精神困弱嘔吐復行予再以辛熱之劑溫之而愈名曰溫中益氣湯

溫中益氣湯

附子

炮去皮
臍五錢

乾姜

炮五錢

丁香

二錢

藿香

二錢

吳茱萸

一錢半

炙甘草

三錢

當歸

一錢

草豆蔻

二錢

益智仁

二錢

參

一錢半

白朮

二錢

陳皮

一錢半

白芍藥

二錢

內經曰寒淫於內以辛熱佐以苦甘溫附子乾姜大辛助陽退陽故以為君草豆蔻益智仁丁香藿香吳茱萸辛熱溫中上吐為臣人參當歸白朮陳皮白芍藥炙甘草苦甘溫補中益氣和血脉協力為佐

右件呖咀每服五錢水二盞煎至一盞去滓溫服食
前病人服一兩

治產後餘惡血未下因感風邪與熱血相搏壯熱頭痛
面赤如醉人眼色瘕急昏悶不醒身如在虛空見
食即吐食不住腹宜吃此方

出護
命方

麻黃

去根
三分

麥門冬

去心

黃芩

牡丹皮

去心

羌活

大

黃

炮
熱

荊芥穗

山梔

射干

各半
兩

官桂

去皮
一分

右為細末不要熬只生杵每服二錢濃薄荷湯調

下大腑祕熱出後不通煎前面藥二錢半取汁調下牽牛末一錢半半夏末一字和滓吃大腑不熱不服牽牛半夏末

琥珀地黄丸

出護類
鈴方

治產後惡露不行增寒發熱如

瘡晝日明了暮則譫言當作熱入血室

琥珀別研延胡索

糯米炒
去米

當歸

各一兩

蒲黃

四兩
炒香

生地

黃

梨汁
留滓

生薑

各二斤研汁留滓生薑汁石器內炒
地黃滓以地黃汁炒姜滓各令汁乾

右為末蜜九彈子大空心當歸湯下無服四物湯

只用地黃加北柴胡煎末退再加小柴胡生地黃黃
芩

治產後血不出

用懸鉤根皮濃煮汁服之



普濟方卷三百四十五

欽定四庫全書

子部

普濟方卷三百四十六

詳校官太醫院醫士臣舒岱

編修臣倉聖脈覆勘

總校官進士臣楊懋珩

校對官中書臣吳甸華

謄錄監生臣李大任

欽定四庫全書

普濟方卷三百四十六 明

周王朱橚 撰

產後諸疾門

產後惡露不盡腹痛

附論

夫產後惡露不斷者蓋由臟腑有冷肺氣不調和既產之後惡露乘虛不能制約淋瀝不斷久不已則經血不榮臍腹堅痛面色萎黃氣短不足是其證也治法宜溫補之劑凡妊娠當風取涼則胞絡有冷至於產時其血

必少或新產而又風涼皆令風冷搏於血血壅滯則不得宣通蓄積在內則有時惡露不下盡故腹痛也凡婦人大產後或腹臍腰痛乃敗血物之致伏也醫者便作虛冷以燥熱藥治之誤人久矣難經曰諸痛為實者熱也可用導水丸禹功散瀉三五行然後以玉燭散和血通經降火益水之藥治之獨不可便服黑神散燥熱之藥當同半產治之

方

桃仁湯

出千金方

治產後往來寒熱惡露不盡

桃仁

五兩

吳茱萸

二升

黃芪

當歸

芍藥

各三兩

生薑

醍醐酥

鍊

柴胡

各八兩

右㕮咀以酒一斗水二升合煮取三升去滓適寒溫

先食服一升日三

甘草湯

出千金方

治產乳餘血不盡逆搶心胃手足逆冷唇

乾腹脹短氣

甘草

芍藥

桂心

阿膠

各三兩

大黃

四兩

右咬咀以東流水一斗煮取三升去滓內阿膠令烊分三服一服入腹中面即有顏色一旦夜盡此三升即下腹惡血一二升立瘥當養之如新產者

大黃湯

出千金方

治產後惡露不盡

大黃

當歸

甘草

生薑

牡丹

芍藥

各三兩

吳茱萸

一分

右咬咀水一斗煮取四升去滓分四服一日令盡加人參二兩名人參大黃湯

蛇黃散

出千金方

治產後血傷不止或下血痢以蛇黃二十

枚火煨醋淬七次搗羅為散每服三錢米飲送下

蒲黃湯

出千金方

治產後餘積有積血不出腹大短氣不得

飲食上衝胃脇時煩憤逆滿手足悁疼胃中結熱

蒲黃

半兩

大黃

芒硝

黃芩

大棗

三十枚

甘草

一兩

右咬咀以水五升煮取一升清晨服五合至日中下
若不止進冷粥半盞即止若不下反少與熱飲自下

人羸者半之千金翼名大黃湯而不用芒硝

銅鏡鼻湯

出千金方

治產餘疾惡露不除積聚作病血氣結

搏心腹疼痛

銅鏡鼻

十八銖燒末

芍藥

芎藭

乾漆

乾地黃

芒硝

各二兩

亂髮

雞子大

大棗

三十枚

大黃

二兩半

右咬咀以水七升煮取二升二合內髮灰鏡鼻末分

三服

小銅鏡鼻湯

出千金方

治產後餘疾惡露不除積聚作病血

氣結搏心腹疼

銅鏡鼻

十銖燒末

甘草

黃芩

大黃

芒硝

乾地黄

各三兩

桃仁

五十枚

右咬咀以酒六升煮取三升去滓內銅鏡鼻末三服

亦治遁尸心腹痛及三十六尸疾

梔子湯

出千金方

治產後流血不盡小腹絞痛

用梔子三十個以水一斗煮取六升內當歸芍藥

各二兩蜜五合生薑五兩羊脂五兩於梔子汁中煎取二升分三服日三

生地黄湯 治產後三日至七日腹中餘血未盡絞痛

生地黄五兩生薑三兩大黃芍藥

茯苓細辛桂心當歸

甘草黃芩各一兩半大棗二十枚

右㕮咀以水八升煮取二升半去滓分三服日三

麻子酒出千金方治產後血不去

用麻子五升搗碎以酒一斗漬一宿明旦去滓溫
一升先食服不效夜服一升不吐不下忌房事一
月將養如初產法

升麻湯

出千金方

治產後惡物不盡或經一月半歲一歲

用升麻三兩以清酒五升煮取二升去滓分溫二
服當吐下惡物甚良

治產後惡血不盡腹中絞痛刺不可忍

出千金方

大黃

黃芩

桃仁

各三兩

桂心

甘草

當歸各二兩芍藥四兩生地黃六兩

右㕮咀以水九升煮取二升半去滓食前分三服

治產後惡血不除四體並惡方

出千金方

用續骨木碎如筭子大以水一斗煮取三升分三服相去如人行十里久間食粥或小便數或惡血下即瘥此木得三遍煮

羚羊角散

出肘後方

治產後惡血下不盡煩悶腹痛

方見本門血暈

治產後餘血不盡奔上衝心悶腹痛

出千金方

搗生藕汁取飲二升甚驗一方飲一升

治產後有血心煩腹痛

出大全良方

用生地黃汁不拘多少以清酒一升將地黃汁和煎二十沸分三服

又方

出千金方

用赤小豆搗散取東流水和服方寸匕不瘥更服亦治心悶目不開

治產後血不可止者

出聖惠方

乾菖蒲三兩以酒五升漬煮取三升分再服即止

桃仁湯

出大全良方

治產後惡露方行忽然漸少斷絕不來

腰中重痛不止兩腹痛如錐刀刺痛入骨中此由血滯於經絡不即通之有大痛處必作癰疽宜桃仁湯恐作癰者預服五香連翹飲

桃仁

去皮尖

蘇木

生地黃

各半兩

蜜蟲

炒去足翅

水蛭

炒各三十個

右為粗末每服三錢水一盞煎至六分去滓溫服無

時候惡露下即住服

五香連翹湯

產經

治產後惡露不絕者由產後傷於經血

虛損不足或分解之時惡血不盡在於腹中而臟腑挾於宿冷致氣血不調血故令淋漓不絕也

木香

沉香

丁香

乳香

麝香

升麻

獨活

連翹

桑寄生

木通

各二兩

右為粗散每服五錢水二盞入竹瀝少許攪停去滓

溫服一方有大黃一兩

療產後惡露不多

出大全良方

川牛膝

大黃

各八分

牡丹皮

當歸

各六分

芍藥

蒲黃

桂心

各四分

右為末生地黃汁調酒服方寸匕日二服血下愈

沒藥丸

出大全良方

治產後惡露方行而忽然斷絕驟作寒

熱臍腹百脉皆痛如以錐刺非常此由冷熱不調或思

慮動作氣所壅過血畜經

當歸

桂心

芍藥

各半兩

桃仁

去皮尖炒碎研

沒藥

研各一分

螭蟲

去足翅炒

水蛭

炒各三十個

右為末醋糊丸如豌豆大醋湯三九下

澤蘭湯

出千金方

療產後惡露不盡腹痛往來兼胸滿少氣

蓋產後惡露不盡腹痛者何答曰產後惡血雖常通行或因外感五邪內傷七情至截然而止餘血停積壅滯不行所下不盡致令腹痛皆因妊娠當風取涼則胞絡有冷至於產時其血必少減新產時而取風涼此日令

風冷搏於血血壅滯則不得宣通蓄積在內有時惡露不盡故令腹痛急引腰背

甘草

六分

大棗

十四枚

右細切以水九升煮取三升分為三服日三墮身欲死服即瘥

救急惡露不盡腹脹痛

取亂髮和雞子灰汁洗淨燒為灰酒調服二錢

又療產後血不盡痛悶方

出肘後方

取荷葉燒作灰煖水和服煮取汁亦良熬令香為末煎水下方寸匕

又方

便產須知

治產後下血及妊娠腹脹

以鐵秤錘一枚燒赤投酒五升中用此酒煮當歸三兩取二升去滓溫再服千金同一方無當歸

療產後下血不盡腹內堅痛不可忍

出永類鈴方

當歸

芍藥

桂心

各三兩

桃仁

一百二十個

右細切以水六升煮取二升分溫二服如未瘥加大

黃三兩

治產後惡露不盡腹痛無計

出永類
鈐方

青木香

當歸

牛膝

川芎

黃芪

芍藥

各八分

大黃

十三分

芒硝

十二分

右細切以水七升煮取二升入大黃更煎三沸分三

服

治產後惡露不盡結聚小腹疼痛

出永類
鈐方

當歸

三分

香附子

一兩 琥珀

沒藥

青皮

赤芍藥

木香

桂心

各半兩

右為細末以豆汁酒調下一錢

地黃飲

出板
粹方

治產後惡露不盡腹內痼痛產後常服甚

妙

生地黃

當歸

炒各
一兩

生薑

細切如蠅頭大
上炒令焦墨半兩

右為細末以薑酒調一錢下

紫金丸

一名失笑散
出大全良方

治產後惡露不快腰痛小腹如刺

時作寒熱頭痛不思飲食亦治久有瘀血月下不調黃

瘦亦治心痛

五靈脂

淘去石炒
乾醋炒末

真蒲黃

右以好米醋調五靈脂末慢火煎成膏子次以蒲黃末搜和丸如櫻桃大每服一九水與童子小便各半鍾煎至七分令藥化溫服之少頃再一服惡露即下久有瘀血成塊月水不利並用酒磨下及治心腹痛欲死百藥不效

生地黃湯

治產後餘血不盡奔衝心煩悶腹痛

方見本門

惡血衝

心類

沒藥丸

出大
全方

治產後心胸煩燥惡血不快

沒藥

研

蠻薑

延胡索

乾漆

炒

當歸

桂心

牛膝

牡丹皮

乾薑

各等
分

右為細末醋煮麴糊為丸如梧桐子大煎麴湯下十

九至十五丸

大調經散

出經驗
良方

治產後血虛惡露未消氣為敗滯榮

衛不調陰陽相勝憎寒惡熱自汗氣衝咤血虛氣衝所為

也

大豆

一兩半
炒去皮

茯神

一兩

真琥珀

一錢

右為細末濃煎烏豆紫蘇湯調下喘急煩滿小便不

利者亦可

治產後穢不盡痛

出聖
惠方

用延胡索為末熱酒調下三錢

治產後惡物上潮痞結大小便不通

出神
效方

芒硝

蒲黃

細墨

各等
分

右為末童便半盞服之

玉燭散

以四物湯承氣湯樸硝等分水煎去滓食前服

當歸養血丸

出和劑方

治產後惡血不散發熱疼痛及惡露

不快臍腹堅脹並室女經脉不調赤白帶下心腹腰脚疼痛

當歸

赤芍藥 牡丹皮

延胡索

各二兩炒

桂心

一兩

右為末蜜丸如梧桐子大溫酒米飲下三十九食前
溫服痛甚細嚼咽下

青金散

治婦人產後惡露不快腰腹疼痛不快

當歸

一兩
焙

甘草

半兩
炒

沒藥

自然銅

三兩
醋汁

右為末每服一錢熱醋食前調下

走馬散

出上海
上方

治產後惡露不散臍下疼若刀攪幾死者

當歸

一兩

紅花

二錢
半

蘇木

二錢
半

沒藥

二錢
半

官桂

去皮二
錢半

右為末每服三錢好酒一大鍾煎三五沸和滓溫服
食先

遇仙湯 治惡露不快腸痛滿脹者血室有冷滯不快
若腹疼如刺者舒眉煎惡心者壯氣九熱者逍遙散無
憂散主之

當歸

桂心

各半兩

白芷

甘草

各三分

右㕮咀水煎食前熱服

治婦人小產惡物滯注不通兩脇脹滿小腸絞痛不可

忍者或變成乾血癆五心煩熱月水不通並治之

當歸

芎藭

芍藥

熟地

各一兩

川棟子

和核研用

玄胡索

各二兩

右為末每服二兩重水八合好酒大盞煎至七分去滓溫服空心滓再煎取下惡物為妙

治產後餘血不盡流入腰脚疼痛至甚者

用五積散加桃仁煎服一名如神湯此藥速敗血去風濕產後惡露方行忽然斷絕不來腰中疼注

兩腿刺痛如錐刀痛入骨此由血滯於經絡不即
通之有大痛處必作癰疽宜桃仁湯恐作癰者預
服五香連翹散

治產後惡露不快及血暈

以三月採取益母草洗擇令乾於箔上攤暴令乾
別用拔斷可長五寸以來忽用刀即置鍋中以水
二碩以來令草上水深二寸三寸煎煮令益母草
爛水三分減二漉出草取五斗汁瀉入盆中澄之

半日以來以綿濾取清汁盆中滓澱盡弃之其清汁於小釜中慢火煎取一斗以來如稀餚每取梨許大熱酒和服之日再服水和羹粥一二服差如遠行不能稀煎即更煉可丸每服之七日內則疼痛漸瘳七日平復

治女子胞中餘血不盡欲死者並治煩悶腹疼用鹿角燒灰以清酒調服方寸匕日三夜一煮豆汁調服亦得不能用豆清煮水作湯用之

治產後猶覺有餘血水氣

用黑豆五升淋酒煎之令烟絕出於瓷器中以酒一斗淬之

治破產婦滯血

用鯉魚煙絕研酒方寸匕

治產後穢痞下不盡腹疼

用生薑二觔以水煮取汁服即出

治破血

以漬苧與產婦溫服之

黃芩湯 治產婦腹中滿疼惡露不盡

黃芩

去黑心

芍藥

赤茯苓

去黑皮

大黃

熟地黄

焙各一兩

厚樸

去皮薑汁炒

乾薑

炮

桂

去皮各一兩一分

蜜蟲

去翅足炒

甘草

炒

桃仁

湯浸去皮尖雙仁炒黃各半兩

枳實

去瓤麩炒

白朮

各一兩半

芒硝

一兩

右粗搗篩每服三錢水酒共一鍾去滓溫服

地黃湯

治產後腹疼餘血未盡不進飲食

芍藥

甘草

炙各一兩 丹參 一兩

右搗篩每服三錢水一盞煎至七分去滓入地黃汁

一合蜜半合生薑汁一合煎數沸空心溫服

芎藭湯 治產後惡血不下盡心腹疼痛

芎藭

一兩半

大黃

剉炒二兩

芍藥

一兩半

黃芩

去心一兩

桂

去皮壹兩

甘草

炙一兩

當歸

切焙二兩

熟乾地黃

焙一兩

桃仁

湯浸去皮尖雙仁炒黃各半兩

右搗篩為末每服三錢水一鍾煎七分去滓空心服

牡丹飲 治產後腹中惡血不除苦身強痛

牡丹皮

一兩

大黃

炒一兩

桂

去皮一兩

桃仁

湯浸去皮尖雙仁炒令黃四十枚

右搗篩每服三錢水一鍾煎七分去滓空心溫服

當歸湯

治產後惡血不盡

當歸

切焙三兩

桂

去皮二兩

荷葉蒂

三七枚

右搗篩每服三錢水酒各一鍾入薑三片同煎七分

去滓溫服早夜各一服

蒲黃飲

治產後惡血不盡攻心乏力腹痛脹滿頭痛

蒲黃

炒一兩半

芒硝

研三分

芫花

兩半

桂

去皮兩半

鬼箭

兩半

生乾地黃

焙兩半

桃

炒二十枚

右搗篩每服三錢棗三枚擘水一鍾煎至七分去滓

溫服

地黃飲

治產後惡血不下或有熱補虛調氣

生地黃汁

半大鍾

桂

去皮兩半

黃耆

剉三分

麥門冬

去皮炒三分

當歸

切炒兩半

甘草

炙兩半

右除地黃外咬咀每服三錢水一鍾煎六分去滓入地黃汁一合更煎沸溫服

羊肉湯 治產後惡血不盡有冷氣腹疼并補虛羸

羊肉

一斤去脂切碎水八盞煮取汁四五盞澄清令冷

桂去皮三分

芡實

兩半

當歸

切焙三分

吳茱萸根

炒黃三分

黃耆

研半兩

右除肉外每服三錢肉汁一盞薑三片煎七分去滓溫服

蜀椒飲 治產後惡血未盡血氣痞痛四肢蒸熱

蜀椒

去目及開口者
炒出汗一分

羊肉

一觔切水三升煮
取汁一升半澄清

桂

炒半兩

當歸

切焙半兩

豉

炒半兩

生乾地黄

剉一兩

右除肉外每服三錢生薑三片葱白一根取肉汁一兩半煎至七分去滓溫服

芍藥湯 治產後惡血不盡腹疼畏寒熱嘔吐

赤芍藥

三分

白茅根

半兩

瞿麥穗

一分

桃仁

皮尖俱去七枚

知母

焙半兩

桂

去皮半兩

樸硝

當歸

剉各一錢

右搗篩每服五錢水一鍾煎至七分去滓再入生地

黃汁半合煎至一鍾溫服日三

劉寄奴湯

治產後惡血不盡七八日腹痛兩脇妨滿

并兒枕痛

劉寄奴

二兩

桔梗

炒三兩

當歸

劉焙二兩

生薑

焙一兩

桂

去皮二兩

陳皮

去白焙一兩半

芍藥

三兩

赤茯苓

去皮三兩

右搗篩每服三錢水一鍾半煎至七分去滓入延胡

索末半錢匕攪勻溫服日三

鼓飲湯

治產後惡血不盡氣血攻心腹痛心中有

熱

豉

炒半兩

羊肉

一觔水八鍾煮取五鍾汁澄清

當歸

切焙半兩

桂

去皮半兩

黃芩

去心三分

麥門冬

去心炒三分

莎草根

炒半兩

生乾地黄

炒一兩半

右除肉外搗篩每服三錢生薑三片葱白一根肉汁

一鍾半同煎至七分去滓溫服

乾地黄湯

治產後惡血不盡除諸疾補不足

乾地黄

三兩

芩薊

桂心

黃耆

當歸

各二兩

人參

防風

茯苓

細辛

芍藥

甘草

各一兩

右咬咀以水一斗煮取三升去滓分三服日再夜一
地黃湯 治產後三日患腰疼腹中餘血未盡並手腿
疼不進食亦治血暈

生地黄汁

一升

芍藥

甘草

各三兩

蜜

一合

生薑汁

半合

丹砂

四兩

右切以水三升煮取一升去滓內地黃汁蜜生薑汁

微火煎一兩沸一服三合日二夜三利兩行中間進食與藥更進服

生薑湯 治婦人產後餘血不盡血流入腰腿疼痛胸急氣滿兩脇皆痛

生薑一升 淡竹葉一升

右以水二升煮取一升去滓分二服

澤蘭湯 治產後惡血不盡臍腹疼痛

澤蘭一兩 當歸炒三兩 生地黃焙二兩

甘草

炒二兩

芍藥

二兩

右搗篩每服五錢水二鍾入棗二枚擘破煎至一鍾

去滓溫服一方用生薑欲死塗身即差

劉寄奴湯

治產後惡血不盡臍腰痠痛壯熱增寒咽

乾煩渴

劉寄奴

知母

焙各一兩

鬼箭羽

桃仁

去皮尖雙仁炒一兩半

當歸

右搗篩每服四錢水一鍾半煎至八分去滓溫空心

食前服

桃仁散

出聖惠方

治產後惡血不盡腹脇疼痛

桃仁

去皮尖炒黃一兩

赤芍藥 芫薺

當歸

剉炒

桂心

菴藺子 琥珀

鬼箭羽

各三分

甘草

炙半兩

右搗篩為散每服三錢水一鍾生薑半分煎至六分

去滓稍熱服不計時

牛膝散

出聖惠方

治產後惡血不盡心腹兩脇疼痛

牛膝

一兩

琥珀

三分

赤芍藥

三分

延胡索

三分

川大黃

三分

牡丹皮

半兩

姜黃

半兩

桂心

半兩

蜚蠊

一分炒
去翅足

當歸

三分炒

桃仁

一兩去皮
尖麤炒黃

枳實

一兩麤
炒黃

右搗篩為散每服三錢水一鍾煎至六分去滓不計

時稍熱服

澤蘭散

治產後惡血不盡腹內疼痛虛煩不食

澤蘭

一兩

當歸

三兩

劉寄奴

二兩

芍藥

一兩

紅蘭花

一兩半

乾荷葉

兩半

右搗篩為散每服四錢水一鍾薑半分煎至六分去

滓不計時候

琥珀散

出聖惠方

治產後惡血不盡心神煩熱四肢疼痛

琥珀

三分

虎杖

一兩

赤芍藥

一兩

桂心

半兩

土瓜根

一兩

川大黃

一兩

當歸

半兩

紅藍花

三分

右搗為散每服三錢水一鍾入生薑半分煎至六分

去滓不計時候服

蘇枋木散

出聖惠方

治證同前

蘇枋木

一兩

當歸

二分

桂心

三分

赤芍藥

半兩

鬼箭羽

半兩

羚羊角屑

一兩

蒲黃

三分

牛膝

一兩去苗

劉寄奴

三分

右為散每服三錢水一鍾生薑半分煎至六分去滓

不計時服

沒藥散

治產後惡血不盡臍腹疼痛

沒藥

木香

琥珀

桂心

各半兩

當歸

炒

赤芍藥

芩薊

騏驎竭

牛膝

去苗各一兩

右為散不拘時每服以熱酒調下二錢

姜黃散

出聖惠方

治惡血不盡痛不可忍

赤鯉魚鱗

二兩燒灰

亂髮

二兩燒灰

椶櫚皮

二兩燒灰

當歸

二兩

麝香

一錢

赤芍藥

一兩

右為散每食後以熱酒調下二錢

敗醬散

出聖惠方

治惡血不盡氣血攻心悶絕

敗醬

三分

琥珀

三分

枳殼

三分麩炒黃

當歸

三分炒

桂心

三分

赤芍藥

三分

赤鯉魚鱗

二兩燒灰

亂髮

二兩燒灰

釜底墨

二兩

麝香

二兩細研

右為散入後四味令勻不計時炙生薑酒調下二錢

桃仁散

出聖惠方

治惡血不盡腹脇疼痛

桃仁

三分去皮尖炒黃

當歸

半兩炙黃

木香

半兩

芡莢

半兩

乾薑

一分炮製

右為散每服二錢不計時熱酒調下

延胡索散

治惡血不盡下疼不可忍

延胡索

乾漆

研碎炒
令煙出

旱蓮子

桂心

當歸

各一
兩

右為散每服食前熱酒調下二錢

烏金散

出聖
惠方

治惡血不下腹內痔痛頭重吃粥嘔逆及

血暈

亂髮

二兩
燒灰

赤鯉魚鱗

二兩
燒灰

香墨

一
定

麝香

一
分

竈突墨

三
分

延胡索

三
分

肉桂

三
分

赤芍藥

三
分

右為散不計時以溫酒調下二錢生薑小便調服亦

得

乾漆散 治惡血不下腹內疼痛

乾漆

一兩碎研
炒令煙出

沒藥

一兩

右為散每服食前以熱酒調下二錢

又方

出聖
惠方

取犁耳燒赤投酒中飲其酒良

又方

出聖
惠方

取鼃尾墨以溫酒調澄清飲一小盞

又方

出聖
惠方

取姜黃一兩以酒一大盞煎至六分去滓分二服

又方

出聖
惠方

用鬼箭羽二兩剉以醋二合酒一升煎至五沸去

滓每服溫飲一小盞頻服效

紫桂散

出楊氏
家藏方

治產後惡露未盡寒熱無時臍腹刺痛

除瘀血養新血

牡丹皮

赤芍藥

各一
兩半

川芎

當歸

焙洗

牛膝

酒浸一宿
各一兩半

肉桂

去粗皮

防風

去蘆頭

香白芷

蓬莪朮

煨香切

大黃

濕紙裹煨

陳橘皮

去白

木通

桔梗

去蘆頭

前胡

京三棱

煨各一兩

右件為細末每服三錢水一盞生薑三片煎至七分

微熱空心食前服

柴胡湯

出千金方

治產後往來寒熱惡露不盡

柴胡

生薑

各八兩

桃仁

五十枝

當歸

黃耆

芍藥

各三兩

吳茱萸

二升

右㕮咀以水一斗三升煮取三升去滓先食一升日

三千金翼以清酒一斗煮

蒲黃湯

出千金方

治產後餘疾胃中少氣腹痛頭疼餘血未

盡除腹中脹滿欲死

蒲黃

生地黄

生薑

各五兩

芡實

桂心

各一兩

芒硝

二兩

桃仁

一十枚

大棗

十五枚

右㕮咀以水九升煮取二升半去滓加芒硝三分日

三服良驗

一聖散

出產六保慶集

治產前安胎產後治惡血不盡胎衣不

下

羌活

川芎

等分

右為細末每服二錢酒少許水七分煎七沸溫服

黑神散

出永類鈴方

治產後惡露不盡胞衣不下攻冲心胸

痞滿或腹臍堅脹撮痛及血暈神昏眼黑口噤產後瘀

血諸疾濟生方除蒲黃加附子

熟地黃

蒲黃

炒

當歸

乾薑

炮

桂心

芍藥

甘草

各四兩

黑豆

炒去皮半升

右細末每服二錢酒半盞童便半盞同煎調服前郭稽中方無蒲黃

小豆湯

出肘後方穢污不盡腹滿

用小豆五升水一斗煮熟飲汁數升即差

醋墨法

出朱氏集驗方

治產後破血

產後用好真松墨半錠火燒赤投醋中如此三遍地上出火毒研羅細每服半錢淡醋湯調服

百草霜散

出朱氏
集驗方

治產後下血不止

細麴

微炒

百草霜

右二錢用無灰好酒調服極妙

團參散

出朱氏
集驗方

治產後惡血未盡渾身增寒發熱小腹

刻刺疼痛心氣膨脹不納飲食面目虛腫脚手浮腫聾

耳眼暈腰痛

乾薑

七錢
炒

蒼朮

炒

天仙藤

甘草

川烏

北芍藥

北細辛

各一
兩

麻黃

去節

右咬咀每服三錢薑五片棗一枚荊芥七穗水煎七分通口服病者只吃白粥及猪肝此藥臨產及產後服三日趕惡血盡畢亦可以暖藥補之即用後清棗散養新血此方乃黃常卿家本

當歸養血丸

出永類
鈴方

治惡露不盡發熱身痛經閉

肉桂

一兩

當歸

牡丹皮

赤芍藥

延胡索

炒各
二兩

右為末蜜丸梧子大空心溫酒下五十丸一方加川

芳莪朮乾薑

蘇木湯

出指南方

治惡血正行或絕或爾腰痛

地黃

芍藥

各三兩

當歸

川芎

蘓木

桃仁

去皮尖百個

水蛭

七個

右為末每服五錢水二盞煎一盞去滓溫服

五香湯

出指南方

木香

沉香

薰陸香

研

丁香

麝香

射干

升麻

獨活

桑寄生 連翹

通草

各三兩

大黃

蒸一兩

右為粗末每服四錢水二盞煎一盞去滓空心熱服

金花散

出黃氏博濟方

逐惡物止腹痛

桂心

去皮

威靈仙

白芷

當歸

牡丹皮

等分

右件五味同杵為末每服二錢煎麴湯調下大凡婦人產後更須常體悶產婦如所出惡物多即不須再三下之過即血虛氣極煩悶暈亂而生病焉如覺比

常少不行切須急攻之氣血自下行上則攻心能令煩悶而心滿意二者為異功開塞詳其病者體虛切不得便進湯散如別證狀候但調氣治血湯散最妙治產後惡血不盡絞痛

以紅藍花酒煮服之

產後惡露不絕

附論

夫惡露不絕者由產後傷於經血氣虛不足或分解之時惡血不盡在於腹中而臟腑挾於宿冷致氣血不調

故令惡露淋瀝不絕也

方

熟乾地黄丸

出聖惠方

療婦人產後惡血不絕崩血不可禁

腹中絞痛氣息急療蓐中三十六疾

亂髮

燒一兩

阿膠

二兩

代赭石

乾薑

各三兩

馬蹄

不燒

熟地黄

四兩

牛角

四兩醋炙

右為細末煉蜜丸如梧桐子大空心米飲下三四十

丸日二服

療惡露不絕

出聖惠方

以鋸截桑木取屑五指撮酒服日三差桑根亦可

療產後泄血不止無禁度及治腹痛胸膈悶

以乾薑末酒服方寸匕日三四服

療產血不止虛羸迨死亦治血氣

出聖惠方

用蒲黃二兩水二升煎取八合頓服酒煮亦得

獨聖湯

出大方全方

療產後無血過多心腹徹痛然後血下久

而不止亦治赤白帶下年深諸藥不能效者

用貫衆狀如刺蝟者一個全用不判斷只揉去毛
花萼以好醋蘸濕慢火炙令香熟候冷為細末用
米飲調下二錢空心食前服

療產後七八日惡露不止

出大全良方

敗醬

當歸

各六分

芍藥

續斷

各八分

川芎

竹茹

各四分

生地黄

炒乾十分

右細剉以水二升煮取八合空心頓服一方無續斷

黑桂散

治產後虛羸臍腹冷痛淋瀝不止或惡物不

下方見本門
血暈類

牡蠣散

出聖惠方

治產後惡露淋瀝不絕心悶氣短四肢乏

弱不思飲食頭目昏重五心煩熱面黃體瘦

牡蠣

川芎

熟地黃

白茯苓

龍骨

各一兩

續斷

當歸

炒

艾葉

酒炒

人參

五味子

地榆

各五錢

甘草

一分

右為末每服二錢水一大盞生薑三片棗一枚煎至六分去滓食前溫服

續命湯

出大全良方

療產後驟血不止

白蜜

匙一

生薑

片一

右同煎候蜜色赤投童子小便一升生薑更煎兩沸
分為三服頓服

治血泄不止無禁

出便產須知

用熟地黃沸湯淨洗酒拌熟地煎為末酒服一匙
頭須更三四服之一方用乾地黃石器內搗為末
每服二錢食前熱酒調

柴胡湯

出經驗良方

治產後往來寒熱惡露不肯下進數服

為佳

柴胡

生薑

各八兩

當歸

牡丹皮

無一方

芍藥

黃耆

各三兩

吳茱萸

四兩

桃仁

五十個去皮尖

右㕮咀每服四錢水薑半煎七分食前溫服千金翼

以清酒一斗煮

治婦人胎後惡露不止

大黃

當歸

川芎

赤芍藥

白茯苓

各一兩

柴胡

北五味

紫蘇

升麻

各半兩

木香

甘草

各三錢

右咬咀每服三錢水一大盞加陳皮同煎若止不用又方用阿膠研酒調服立效

治產後血泄不禁止餘血彌痛兼塊

出肘後方

桂心

乾薑

各等分

右為末空心酒調服方寸匕血不盡妙

產後下血不止

出肘後方

用桑白皮炙煮水飲之

治產後血不止

用黑雌雞子三枚黃脚者尤佳以醋半升好酒二升煎取一升分為四服如人行二三里微煖進之

治產婦惡露下赤白臭穢

出便產須知

用益母草花開時採陰乾為末溫酒調二錢

又方

出便產須知

芍藥

一兩

福薑

炮拆三兩

右為細末每服二錢米飲空心日二三服

白芷丸

治產後所下過多及崩中傷損虛竭少氣面

目脫色腹痛

方見本門後產崩中漏下類白芷丸

栢葉湯

治產後血不止兼漏下

栢葉

炙乾二兩

當歸

切焙

禹餘糧

燒醋淬七遍各一兩半

右粗搗篩每服三錢水一盞入薤白二寸煎七分去

滓食前溫服日三

艾葉飲

治產後惡露不絕心悶氣短

艾葉

當歸

切焙

人參

地榆

乾薑

炮

阿膠

炙令燥

生乾地黃

焙各一兩

右粗搗篩每服二錢煎一盞水至七分去滓溫服日

三

阿膠散

治產後惡露不絕

阿膠

炙令燥

牛角腮

燒灰

龍骨

煨各一兩

右搗篩為散每服三錢薄粥飲調

龍骨丸

出千金方

治產後虛冷下血及惡露不絕及治穀下

晝夜無數

龍骨

細研
四兩乾薑
炮

甘草

炙

桂

去粗皮
各二兩

右為末煉蜜凡如梧子大每服二十九丸溫酒早晨午
晚間各一服一方用人參地黃各二兩

虎掌飲

治產後惡露過多心悶氣無力不能食

虎掌

當歸

切
焙

艾葉

炒各
一兩

人參

半
兩

地榆

三分

生乾地黃

焙一兩
一分

右搗篩每服三錢以生薑三片水一盞煎至七分去

滓溫服

人參飲

治產後惡露多下短氣乏力

人參

半兩

當歸

焙二兩

生乾地黃

焙二兩

地榆

一兩

右粗搗篩每服三錢生薑三片水一盞同煎至七分

去滓溫服

地榆飲

治產後惡露不多心煩氣短減食多倦

地榆

一兩

當歸

切焙

艾葉

人參

各二兩

桂

去粗皮一兩

生乾地黃

焙二兩

右粗搗篩每服三錢以水一盞入生薑三分同煎去滓空心溫服一方無桂

桑甘飲 治產後下血不止

桑甘微炙 芍藥 地榆 茜根

牛角鰓燒灰 阿膠炙令燥 艾葉

雞蘇各三分 白龍骨二兩

右粗搗篩每服二錢水一盞煎至七分去滓溫服早

晨日午夜卧各一服

芍藥丸 治產後血下不止

芍藥

阿膠

炙令燥各一兩半

當歸

切焙三分

烏賊魚骨

去皮甲一兩

右為末煉蜜和丸梧桐子大空心以葱湯下三十丸

日三

地黃丸 治產後惡露不斷

生乾地黃

焙

當歸

切焙

阿膠

炙令燥

黃耆

剉各一兩

艾葉

炙三分

生薑

切炒一分

右為末醋煮麪糊和丸如梧桐子大每服三十丸溫酒或米飲下不拘時

秦朮湯 治產後惡露不斷

秦朮

去苗

玄參

芍藥

各一兩

艾葉

炙

白芷

續斷

當歸

切焙各一兩半

右粗搗篩每服二錢水一盞生薑三片煎至七分去滓服不拘時

寄生丸 治產後惡露不斷

桑寄生

劉炒

附子

炮製去皮臍

芍藥

各一兩

地榆

劉炒

白龍骨

各一兩半

雞蘇

三分

右為末煉蜜和丸梧桐子大每服三十九溫酒或米飲不拘時

治一切宿血及傷損瘀血在腹內不問新久并婦人月經不通產後惡血不下皆良

大黃

芒硝

各三兩

桃仁

四十枚去皮尖

右芒硝桃仁合搗四五杵以酢漿二升半漬一宿空

腹擾調頓服之不能頓服者分作兩服良久先下糞
次下如豆泥汁或黑血為驗強人日別服一劑弱人
兩日服之下血盡便止不過三兩劑忌生冷茶葵
治產後若惡露下多少得所寒熱得調更無餘狀但覺
腹內切痛可而復

當歸

五兩

生薑

六兩

桂心

三兩

芍藥

二兩

右切以水酒各三升半煮取二升三合去滓分溫三
服忌生葱

治產後惡露雖下不甚通利遂覺心腹滿悶脇肋脹妨
兼咳喘息急不能飲大便不通眼澁坐起不穩心腹時

時痛宜服

出大全良方

白朮

當歸

桑白皮 大黃

各三兩

生薑

四兩

細辛

桂心

各二兩

右以水八升煮取二升六合去滓分溫三服此藥當
得利大利不宜只取微利緣初產時體虛尚藉藥食
補之豈宜大利此緣病熱既不可勿以當途此湯得

通息安貼利脫未止須斷之取三兩匙酢飲飲之即止適寒溫將攝佳忌桃李雀肉生葱生菜如利不減

宜服後方

當歸丸

出大全良方

如利後諸疾不減

當歸

十分

白朮

八分

甘草

炙七分

生薑

六分

桑皮

六分

桂心

三分

人參

三分

細辛

四分

右搗篩蜜丸梧桐子大以酒下十五丸至二十九忌

如常法

治婦人小產惡露淋瀝不斷將近月餘諸藥不效

用真五靈脂炒微焦為末飯糊丸梧桐子大每服

三四十丸米飲送下酒亦得應手而有效

阿膠散

出聖惠方

治產後惡露不絕心腹疼痛不思飲食

阿膠

一兩炙令黃燥

芎藭

一兩

艾葉

半兩微炒

當歸

一兩剉微炒

桂心

一兩

地榆

一兩剉

甘草

半兩炙微炒

厚樸

二兩去粗皮塗生薑汁炙香熟

右搗篩為散每服三錢以水一中盞入棗二枚煎至

六分去滓不計時候溫服

龜甲散

出聖惠方

治產後惡露不絕腹內痞刺疼痛背膊煩

悶不欲飲食

龜甲

一兩塗散炙令黃

當歸

三分剉微炒

乾薑

一分炮裂剉

阿膠

半兩搗碎炒令黃燥

訶梨勒

一兩煨用皮

龍骨

一分

赤石脂

半兩

艾葉

半兩微炒

甘草

一分炙微赤剉

右搗細羅為散不計時候以熱酒調下二錢

艾葉散

出聖惠方

治產後惡露不絕臍腹時痛

艾葉

三分
微炒

當歸

三分
微炒

白芍藥

一兩

芩窮

半兩

熟乾地黃

一兩
半

續斷

一兩

牛膝

半兩
去苗

桑耳

半兩

敗醬

三分

右搗羅細為散每服食前以薑粥調下二錢

鹿茸散

出聖
惠方

治產後臟虛冷致惡露淋瀝不絕腹中時

痛面色萎黃羸瘦無力

鹿茸

一兩去毛塗
酥炙令黃

卷栢

半兩

桑寄生

半兩

當歸

半兩剉
微炒

附子

半兩炮
去皮臍

龜甲

一兩塗酥炙令黃

續斷

兩半

白芍藥

兩半

阿膠

半兩剉碎炒令黃燥

地榆

半兩剉

熟乾地黄

兩半

右搗細羅為散每服食前以生薑溫酒調下二錢

普濟方卷三百四十六